

## PRINCIPALES VARIEDADES DE UVA DE MESA EN CHILE

# Blush Seedless

**V**arietad originada por un cruzamiento entre Emperor y Z 4-87 en Davis, California por Harold Olmo. Fue introducida comercialmente en Estados Unidos en 1981 y en Chile alrededor de los años 1983-85, encontrándose hoy bajo patente. Los racimos son de tamaño grande, largos, cónicos, ligeramente compactos y de un peso promedio, preparados para exportación, que fluctúa entre 520 y 640 gramos.

Las bayas son de color rojo y sin semilla, aunque presentan rudimentos de ellas de color verde bastante imperceptibles. La pulpa es carnosa de un sabor neutro. El calibre de las bayas fluctúa entre 17,4 y 18,2 milímetros.

La planta es muy similar a la variedad Emperor. Es vigorosa y muy fértil. Presenta un hábito de fructificación en yemas basales, lo que hace que se adecue bien a una poda en cordón, con pitones de 2 a 3 yemas. También puede podarse en sistema Guyot.

En relación a su conducción, se adapta bien al sistema de parrón, pero, dado su color y hábito de



fructificación, se podría comportar adecuadamente en un sistema de espaldera, como la cruceta Californiana simple, doble u otros. Es una variedad que no requiere de aplicaciones de ácido giberélico para el crecimiento de sus bayas. La cosecha se debe realizar cuando los racimos presentan un color uniforme y un contenido de azúcar no inferior a 15,5-16°Brix. Como es una variedad de madurez tardía, estas condiciones se producen en la zona de Aconcagua entre el 5 y 10 de marzo.

En relación al desgrane, posee buenas características para el almacenaje en frío. En estudios realizados por el INIA se determinó que después de 60 días de almacenaje, el desgrane era entre 1 y 1,25 por ciento. Además, el escobajo durante dicho período se mantuvo en condiciones adecuadas.

Actualmente en Chile prácticamente no existen plantaciones comerciales. A la fecha las estadísticas no registran volúmenes exportados.