

## PRINCIPALES VARIEDADES DE UVA DE MESA EN CHILE

## BLACK SEEDLESS

**E**l origen genético se desconoce, aunque se cree que proviene de una selección chilena lograda en la localidad de Llay-Llay, en el valle de Aconcagua. Su cultivo comercial es relativamente nuevo.

Los racimos son de tamaño medio, de forma tronco cónicos, alados y bastante sueltos. El peso promedio, preparados para exportación, fluctúa entre 760 y 1.000 gramos.

Las bayas no tienen semillas, son de color negro, de forma cilíndrica, ligeramente crocantes, de piel relativamente gruesa y pulpa de sabor agradable. Su calibre fluctúa entre 17 y 19 mm cuando se tratan con ácido giberélico. Sin ácido giberélico alcanza un calibre máximo de 14 a 15 mm (diámetro ecuatorial). Puede presentar problemas de coloración, especialmente cuando en la planta se dejan muchos racimos para cosecha.

Es una variedad que responde bien a aplicaciones de ácido giberélico, haciendo similares tratamientos a los realizados para Sultanina. La técnica del anillado también es satisfactoria tanto para aumentar el tamaño de las bayas como para uniformar el color.

La planta es vigorosa, con muy buena productividad y alta fertilidad de yemas. Tiene un hábito de fructificación sobre yemas basales, lo que hace que se



Esta serie fue iniciada en la publicación  
IPA LA PLATINA, N°83

adecue muy bien a una poda en cordón con pitones de 2 a 3 yemas. También puede podarse en sistema Guyot con cargadores de un largo no superior a 8 ó 10 yemas.

En cuanto a su conducción se adapta y cultiva tradicionalmente en sistema de parrón, aun cuando se desarrolla muy bien en sistemas de espaldera, como la cruceta californiana simple, doble u otros.

La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color uniforme y un contenido mínimo de azúcar de 16 °Brix, lo que ocurre para la zona de Aconcagua junto con Sultanina a mediados de enero y para la Región Metropolitana 10 a 15 días después.

Presenta buenas condiciones de almacenaje en frío en cuanto a desgrane y características del escobajo (deshidratación).

Esta variedad es de bastante importancia para Chile, ya que de acuerdo a estadísticas elaboradas por la Asociación de Exportadores de Chile, durante la temporada 1993/94 ocupó el séptimo lugar con un volumen exportado de 1 millón 820 mil cajas, lo que representa el 2,9 por ciento del total de las exportaciones de uva de mesa.

Se cultiva desde Copiapó a la VI Región, no manteniendo el ritmo de plantación de otras variedades.