

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TERNEROS HEREFORD

Resulta indiscutible el papel que ha ido tomando, en las últimas temporadas, la producción bovina de Magallanes, hacia la exportación de animales en pie al centro y sur del país. Esto ha convertido a la región en una zona esencialmente criancera. Tendencia lógica, dadas las condiciones agroclimáticas y de manejo tradicionalmente extensivo.

No obstante lo anterior, el comportamiento errático de los mercados para terneros, y bovinos en general, ha creado incertidumbre en los productores respecto a qué sistema de producción optar, quienes se preguntan si será posible dedicar al menos una parte del sistema a obtener novillos, en forma más o menos eficiente. Para ponderar las opciones de la empresa ganadera resulta imprescindible conocer el comportamiento productivo de los animales a través del tiempo, de esta manera podrán definirse estrategias de manejo y comercialización del producto.

En zona de transición estepa-matorral de la XII Región, INIA Kampenaike hizo un seguimiento de animales Hereford desde el nacimiento hasta los 14 meses de edad.

La evaluación en cuestión se realizó sobre terneros de un grupo controlado de vacas Hereford puras, de dos o más partos. El manejo fue el tradicional para la región, vale decir destete en abril y posterior manejo sobre pradera natural sin recibir nunca suplementación.

La figura y el cuadro 1 presentan los resultados del seguimiento, separados para machos (enteros) y hembras.

Seguimiento de animales Hereford desde el nacimiento hasta los 14 meses.



Raúl Lira F.
Ingeniero Agrónomo
INIA Kampenaike

Al observar los datos, destaca la fuerte y lógica baja de los aumentos de peso postdestete, señalado por el quiebre de la curva a los 166 días de edad. Sin embargo, sólo se detectan pérdidas de peso entre julio y septiembre (260 a 321 días de edad).

A partir de octubre se observa un fuerte aumento de peso. Entre ese mes y diciembre se midieron ganancias diarias superiores a un kilogramo por animal pastoreando praderas de tipo vega. Resumiendo entonces, y teniendo claro que cada sector, e incluso cada predio, presenta condiciones diferentes, deberá decidirse cuál es el mejor momento de venta: el destete, esperar un diferencial de precio sin aumentar de peso o tender a cambiar la pendiente de la curva luego del destete, ya sea vía suplementación o praderas rezagadas para el efecto. ▲

Cuadro 1

Peso ajustado edad y fecha de control, terneros Hereford. Sistema extensivo, Magallanes

Edad (Días)	Fecha control
1 (nacimiento)	Octubre-noviembre/90
166 (destete)	09 abril 91
205	23 mayo 91
260	12 julio 91
321	11 septiembre 91
365	24 octubre 91
427	27 diciembre 91

